



次回の通院予約日は

_____ 月 _____ 日()です

忘れないように、カレンダーなどに記入しておきましょう。

通院予約日の変更が可能な範囲は

_____ 月 _____ 日()～

_____ 月 _____ 日()です

通院予約日を変更する必要がある場合には、
医療機関に連絡し、忘れずに通院予約日を変更してください。

医療機関の連絡先



この治療について、Webサイトで詳しい情報をご覧いただけます。
こちらの二次元コードからWebサイトにアクセスできます。
<https://www.longacting.jp/>



編集協力

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター
名誉センター長 岡 慎一 先生

ヴィーブヘルスケア株式会社



ボカブリア+リカムビス®による治療を受けられる方へ

注射部位反応

注射したところが痛くなったり、かゆくなったりすることがあります。どのような症状が起こることがあるのかを知っておきましょう。

(10%以上の発現頻度)

- 疼痛
- 結節
- 硬結

(1～10%未満の発現頻度)

- 不快感
- 腫脹
- 紅斑
- そう痒感
- 内出血
- 熱感
- 血腫
- 知覚消失

注射部位反応への対処方法

注射したところの違和感を和らげるために

- 体を動かしたり、ストレッチをするように心がけましょう。
- 長時間、座り続けないようにしましょう。
- **激しい運動**は避けましょう。

気になる症状があらわれたり、注射部位反応が続く場合は、主治医などの医療関係者に相談してください。

ボカブリア水懸筋注

製造販売元

ヴィーブヘルスケア株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

販売元

グラクソ・スミスクライン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1




プロモーション提携

SHIONOGI

大阪市中央区道修町3-1-8

リカムビス®水懸筋注



製造販売元

ヤンセンファーマ株式会社
東京都千代田区西神田3-5-2

販売元

グラクソ・スミスクライン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

提携先

ヴィーブヘルスケア株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1



提携先プロモーション提携

SHIONOGI

大阪市中央区道修町3-1-8

NP-JP-CBR-PINF-220003-P2303N

VR-C-0004 (V02)

作成年月2023年3月